CURSO DE PRODUCCION DE MANI - 2017

Manejo de suelos

José Manuel Cisneros

Contenidos

- a. Calidad de suelos, indicadores**
- b. Degradación del suelo**
- c. Recuperación de productividad**
- d. Técnicas de manejo**
 - Ondulados**
 - Anegables**
 - Medanosos**

CONTEXTO AMBIENTAL Y PRODUCCION DE MANI

**AMBIENTES
ONDULADOS**

**AMBIENTES
MEDANOSOS**

**AMBIENTES
SEMIARIDOS**

**AMBIENTES
MAL DRENADOS**

Mapa N°2: Distribución espacial del cultivo de Maní,
Provincia de Córdoba-San Luis-La Pampa - Campaña 2014/2015

Fiant et al, 2015

AMBIENTES ONDULADOS

AMBIENTES MEDANOSOS

AMBIENTES MAL DRENADOS

AMBIENTES SEMIARIDOS

Dinámica de la CALIDAD del suelo: Resistencia y resiliencia.

Efectos del uso en un suelo franco de General Deheza

Variable evaluada	Suelo agrícola (80 años)	Suelo virgen (Monte)
Lámina infiltrada acumulada (mm)	35	710
Velocidad de Infiltración (mm h ⁻¹)	7,4	312
Coeficiente de escurrimiento (%)	33	≈ 0

CONCEPTOS DE CALIDAD DE SUELOS

"CAPACIDAD DE UN TIPO ESPECIFICO DE SUELO PARA FUNCIONAR DENTRO DE LOS LIMITES DEL ECOSISTEMA, PARA SOSTENER LA PRODUCTIVIDAD BIOLOGICA, MANTENER LA CALIDAD AMBIENTAL Y PROMOVER LA SALUD DE PLANTAS Y ANIMALES"

"MEDIDA DE LA CAPACIDAD PARA FUNCIONAR ADECUADAMENTE CON RELACION A UN USO ESPECIFICO"

Erosión y degradación

- **Degradación:** Proceso paulatino y reversible de pérdida de una función del suelo
- **Erosión:** Proceso paulatino o repentino e irreversible de pérdida del suelo como tal
- **Degradación** condición necesaria para **erosión**
- **Retroalimentación positiva** entre ambos

LA DEGRADACION DE LA CALIDAD DE LOS SUELOS AGRICOLAS

FISICA

Compactación, raíces encostramiento, escurrimiento

QUIMICA

Balance de nutrientes, salinización, contaminación

BIOLÓGICA

Balance de materia orgánica, biomasa microbiana, biodiversidad

FISICO-
QUIMICA

Acidificación, alcalinización

INDICADORES DE CALIDAD

FISICOS

Densidad aparente
Resistencia mecánica
Vel. de Infiltración
Cond. hidráulica K
C.A.Util
% residuos
Textura - estructura
Est. Agregados
Profundidad del A
Isotropía
Prof. Napa freática
Signos de erosión
Pendiente

QUIMICOS

C.I.C
Saturación bases
Cond. Eléctrica (CE)
RAS – PSI
P extractable
K intercambiable
N-total
pH
Al intercambiable
NO₃ y NH₄
NO₃ y P en aguas

BIOLOGICOS

MO Total
MO labil
Respiración
Mesofauna
Inóculos de suelo
Residuos de herbicidas
Biomasa microbiana
N potencialmente mineralizable
Raíces (DLR, forma, ...
Producción

Degradación de suelos: Funciones que se pierden

FISICAS

Compactación por tránsito

Captación y consumo de agua:
Resistencia a sequía

Aumento de escorrentías y erosión: Estabilidad del suelo

Menor exploración del suelo:
Eficiencia de captación de N

Mayor incidencia de enfermedades del suelo (F. solani)

Degradación de suelos: Funciones que se pierden

QUIMICAS

Balance de corto plazo

Disponibilidad de nutrientes:
Dependencia de fertilizantes

Acidificación: Nutrientes y toxicidad

Salinidad/alcalinidad:
Absorción de agua

Acidificación – Saturación con bases

Localidad	CIC	M.O.	Textura	pH	% Ca
Washington-Mackenna	9,26	1,37	Arenoso franco	6,25	59,11
Cabrera	11,40	1,37	Franco arenoso	5,40	52,87
Río Cuarto-Ensenadas	16,24	2,89	Franco	5,76	50,20
Dalmasio Vélez	13,37	1,90	Franco limoso	5,74	59,23

Dosis de CO_3Ca (kg/ha) requeridas para elevar en distintas unidades el pH

Localidad	pH						
	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
Washington-Mackenna	994	1994	2994	3994	4994	5994	6994
Cabrera	2494	4994	7494	9994	12494	14994	17494
Río Cuarto-Ensenadas	1661	3328	4994	6661	8328	9994	11661
Dalmasio Vélez	1244	2494	3744	4994	6244	7494	8744

Fuente: Pezzini, et al, 2010.

Degradación de suelos: Funciones que se pierden

BIOLOGICAS

Balance y nivel de M.O.

Disponibilidad de nutrientes:
Dependencia de fertilizantes

Estabilidad de terrones:
Pérdida de infiltración

Nuevas poblaciones de malezas:
Dependencia de agroquímicos

Enfermedades de suelo

Criterios de suficiencia de la materia orgánica

NIVEL Y BALANCE DE M. O.

Balance de MO:

Entradas = Kg Residuos x % humificación

Salidas = Kg MO inicial x % mineralización

MODELOS PARA ESTIMAR EL CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA DE EQUILIBRIO

Modelo lineal de Feller

$$C \text{ (g kg}^{-1}\text{)} = 0,32 * [\text{arcilla+limo \%}] + 0,87$$

Modelo de Titonell (datos regionales)

$$C \text{ (g kg}^{-1}\text{)} = 0,79 [\text{arcilla+limo \%}] + 0,40$$

Modelo de Buschiazzo y Quiroga (nivel mínimo)

$$IMO = \left[\frac{MO}{Ar + Li} \right] \cdot 100 \quad MO \text{ (\%)} = 0,05 [\text{arcilla+limo \%}]$$

Balance de materia orgánica: MO inicial 1,5%

Tendencia de largo plazo: Materia orgánica de equilibrio de la rotación: **CON** cultivos de cobertura en SOJA y MANI Campo LA

PERLA

Manejo del agua

ESCENARIOS DE SEQUIA

CONTROL DE EVAPORACIÓN DIRECTA

COBERTURAS, SIEMBRA DIRECTA, VELOCIDAD DE CIERRE DEL SURCO

Manejo del agua

ESCENARIO HUMEDO

Control de escorrentía/erosión

AUMENTAR LA
RESISTENCIA DEL
SUELO

Nivel de MO

MEJORA DE
INFILTRACIÓN
INICIAL Y FINAL

+ Descompactación

+ Cobertura

MAXIMIZAR LA
RETENCION
SUPERFICIAL

+ Linea de siembra

+ Sistematización

Importancia del manejo del agua

Pérdidas de agua para suelo sin manejo

Lluvia: 83 mm 3 hs = **32 mm (37%)**

Lluvia: 50 mm 3 hs = **9 mm (18%)**

Lluvia: 35 mm 3 hs = **3 mm (8%)**

Cuenta rápida: pérdida 20 % de la lluvia

20% * 500 mm = 100 mm

EUA Maní = 5-9 Kg grano/mm

Pérdida potencial = 5 – 9 qq/ha

ENCOSTRAMIENTOS

COMPACTACION POR TRÁNSITO

EFFECTO "MACETA"

BUDASSI

Soil surface

40 cm

30 cm

20 cm

10 cm

4th tine group

3rd tine group

2nd tine group

1st tine group

Laboreo y Resistencia del suelo

Laboreos e infiltración

Figura 8. Velocidad de Infiltración Final (mm/h) para las diferentes rotaciones y labranzas.

Descompactación y producción

(Tomados de 3 últimos congresos de suelo)

Cultivo	Ambiente	Diferencia	Fuente
Maíz	P. ondulada	+ 6 %	Alvarez y col., 2010
Soja	V. Tuerto	Sin efecto	Montanari, 2008
Maíz	P. ondulada	+ 13 %	Bustingorri y col., 2006
Avena	Azul	+20-51 %	Ressia y col. 2006
Maíz	La Pampa	+ 27 %	Ferrero y col., 2006
Trigo	E. Ríos	+ 33 %	Indelangelo y col., 2008

Cultivo	Ambiente	Diferencia	Fuente
Maíz	Rojas, V. Tuerto	+2-10 %	Alvarez y col., 2008
Maíz	Lujan	13 %	Faita y Cisneros, 2008
Soja	G. Viamonte	Sin efecto	Soza y col., 2008
Maíz	P. ondulada	Sin efecto	Introcaso y col., 2008
Soja	Gigena	+ 6 %	Martinez, 2011
Maíz	Río Cuarto	+ 17 %	Bergesio y col., 2010
Maíz	Junin	0 a -17 %	Richmon y col., 2010
Maíz	San Luis	+ 30 %	Casagrande com. Pers.

SISTEMA DE LABOREO OPTIMIZADO

**PROTECCION
SUPERFICIAL**

**HOMOGENEIDAD
FISICA**

**ALTA TASA DE
INFILTRACION**

**CONTROL DE LA
COMPACTACIÓN**

**MANTENIMIENTO -
AUMENTO DE LA
MATERIA ORGANICA**

Lineas de siembra - Sistematización

- Cultivo cortando la pendiente
- Cultivo en curvas de nivel
- Cultivo en fajas
- Cultivo en terrazas

CULTIVO CORTANDO LA PENDIENTE

CULTIVO EN CURVAS DE NIVEL

16 12 2004

CULTIVO EN FAJAS CORTANDO LA PENDIENTE

CULTIVO EN FAJAS EN CURVAS DE NIVEL

di

LA PEN

FAJA DE PASTO O
CULTIVO DENSO
(PROTECTORA)

FAJA DE CULTIVO
RALO O TARDIO
(PROTEGIDA)

INTERCULTIVOS (SOJA- MAIZ)

INTERCULTIVOS MANI- MAÍZ

CULTIVO EN TERRAZAS DE ABSORCIÓN

TERRAZAS DE ABSORCIÓN

TERRAZAS DE ABSORCIÓN

TERRAZAS DE ABSORCIÓN

TERRAZAS DE ABSORCIÓN

CULTIVO EN TERRAZAS DE DESAGUE

PLANO DE CURVAS DE NIVEL DEL
LOTE

di

LAPEN

CULTIVO EN TERRAZAS DE DESAGUE

**MANI EN LOS AMBIENTES
ANEGABLES.
Criterios de selección de lotes**

PROFUNDIDAD DE NAPA

PLANICIES ALTAS
NF + 3 m

APTAS S/ MANEJO

PLANICIES MEDIAS
NF ENTRE 3 y 2 m

APTAS S/AÑO

PLANICIES BAJAS
NF ENTRE 1,2 y 2 m

MUY APTAS
S/SALINIDAD NAPA

PLANICIES
DEPRIMIDAS NF - 1,0
m

NO APTAS

19/06/2007

Medición de napas: freatímetros

14/11/2009

MANI en del Campillo

(Tesis de Master Ing. Agr. Manuel Scilingo)

MANI TIPO RUNNER VAR GRANOLEICO

MANI en del Campillo

(Tesis de Master Ing. Agr. Manuel Scilingo)

Relación Grano/Caja vs. Profundidad de napa

(Grano/Caja)/Prof. Napa

MANI en del Campillo

(Tesis de Master Ing. Agr. Manuel Scilingo)

% Confitería / Profundidad de napa

Granos Confitería/Prof. Napa

Loma

Media
Loma

Bajo

MAPAS DE NAPAS TALAPENDA

Genérico
 SINPRODUCTO
 Napa
 Napa 2009.mif

Pri... M... Tr...

1 Napa 2009.mif | SIIPROD

Capa activada

Elevación

Transparencia - 100 %

Elevación (m)

Dark Blue	-1 - 0
Blue	-1.15 - -1
Light Blue	-1.35 - -1.15
Yellow	-1.5 - -1.35
Light Green	-1.7 - -1.5
Green	-2.2 - -1.7
Light Blue	-2.5 - -2.2
Pink	-4 - -2.5
Cyan	-9 - -4

Crear mapa nuevo >>
 Añadir a mapa actual >>

0 500m

Fuente: Ing. F. Bolatti

27 - 2006 Soya 05-06

MAPAS DE RINDES TALAPENDA

Rinde Real
23,36qq en 123has
Azul 34 qq
Verde claro 22qq
Rosa 13qq

Clic para poner texto o seleccione editar.

Fuente: Ing. F. Bolatti

**MANI EN LOS AMBIENTES
MEDANOSOS. La erosión eólica**

17 11 2004

CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS:

1. TEXTURA

Sitio	Situación/uso	Arcilla %	Limo %	Arena %	Textura
Washington	Pastizal natural	5,0	10,9	84,0	Arenoso franco
	Ganadero Llorón	5,3	11,9	82,8	Arenoso franco
	Ganadero Cebada	3,6	7,1	89,3	Arenoso
	Agrícola puro	4,5	11,2	84,2	Arenoso franco
	Médano Vivo	2,2	5,2	92,6	Arenoso
del Campillo	Agrícola degradado	2,9	5,1	91,2	Arenoso
	Agrícola	4,9	11,0	83,7	Arenoso Franco
	Mixto	6,4	15,1	78,0	Arenoso Franco
	Pastizal Natural	5,6	16,1	77,8	Arenoso Franco

Fuente: López F, Clérici, Cisneros, Cholaky, 2008

CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS:

2. ESTABILIDAD DE TERRONES

Sitio	Situación/uso	Estabilidad de Agregados (%)
Washington	Pastizal natural	100
	Ganadero Llorón	98.3
	Agrícola puro	61.9
	Ganadero Cebada	60.8
	Médano Vivo	0
del Campillo	Mixto	100
	Pastizal Natural	24.3
	Agrícola	16.1
	Agrícola degradado	6.3

Fuente: López F, Clerici, Cisneros, Cholaky, 2008

CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS:

3. MATERIA ORGANICA

Profundidad (cm)	Tierra Virgen	Ganadero Llorón	Ganadero Cebada	Agrícola Soja	Médano Vivo
2,5	2,45 A	2,57 A	1,57 AB	1,00 BC	0,16 C
7,5	1,09 AB	0,74 C	1,14 A	0,85 BC	0,16 D
25	0,52 A	0,38 A	0,43 A	0,44 A	0,16 B

Profundidad (cm)	Mixto	Pastizal Natural	Agrícola	Agrícola Degradado
2,5	2,30 A	1,89 B	0,98 C	0,39 D
7,5	1,38 A	1,21 A	0,83 B	0,47 C
25	0,92 A	0,62 B	0,19 C	0,15 C

Fuente: López F, Clerici, Cisneros, Cholaky, 2008

CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS: 4. FRACCIÓN EROSIONABLE

Fracción erodable sitio Washington

CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS: 4. FRACCION EROSIONABLE

Fracción erodable sitio del Campillo

CONCLUSIONES

**SUELOS
ARENOSOS**

FRAGILIDAD

**CLIMA
INESTABLE**

VARIABILIDAD

**RELIEVES
COMPLEJOS**

HETEROGENEIDAD

**CRITERIOS DE SELECCIÓN DE
LOTES
O AMBIENTES DENTRO DE LOTES**

**POR SUCEPTIBILIDAD A
VOLADURA**

POR PROFUNDIDAD DE NAPA

**POR NIVEL DE DEGRADACIÓN
ACTUAL**

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOTES

POR SUCEPTIBILIDAD A VOLADURA

AREAS DE DISIPACION DE MEDANOS

NO APTAS

LOMAS VOLADAS

NO APTAS

PLANICIES ALTAS

APTAS S/ MANEJO

PLANICIES BAJAS B. DR.

MUY APTAS

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOTES

POR NIVEL DE DEGRADACION

**BIEN ROTADOS/
ANTECESOR ADECUADO
ALTO NIVEL DE P**

APTOS S/MANEJO

**AGRICOLA
PURO/ANTECESOR
SOJA
BAJO NIVEL DE P**

APTOS S/MANEJO

**ALTO DETERIORO
ANTECESOR MANI
M.O./ARENA/F.E.**

NO APTO

PRACTICAS DE MANEJO DEL SUELO

AUMENTAR LA RESISTENCIA DEL SUELO

PROTEGER LA SUPERFICIE DEL SUELO

DISMINUIR LA VELOCIDAD DEL VIENTO

DETENER LAS PARTICULAS EN MOVIMIENTO

PROTECCION POST-ARRANCADO Y POSTCOSECHA

MEJORAR EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA

PRACTICAS DE MANEJO DEL SUELO

AUMENTAR LA RESISTENCIA DEL SUELO

MEJORAR ESTRUCTURA

ROTACION

GRAMINEAS PASTURAS

CULTIVOS DE COBERTURA

AUMENTAR HUMEDAD

RASTROJOS

SIEMBRA DIRECTA

PROTEGER LA SUPERFICIE DEL SUELO

RUGOSIDAD (LABORES DE EMERGENCIA)

CUBIERTA DE RESIDUOS

DISEÑOS DE SIEMBRA

DISMINUIR LA VELOCIDAD DEL VIENTO

BARRERAS FORESTALES

CULTIVOS INTERCALADOS

RESIDUOS EN PIE

DIRECCION DE SIEMBRA

PRACTICAS DE MANEJO DEL SUELO

**DETENER LAS
PARTICULAS EN
MOVIMIENTO**

*FRANJAS DE
PASTOS*

*CULTIVOS
INTERCALADOS
(FRANJAS DE
CULTIVOS ANUALES)*

**PROTECCION
POST-ARRANCADO Y
POSTCOSECHA**

*SIEMBRA DE
VERDEO EN
ARRANCADO*

*CONTROL DE
INCENDIO DE
RASTROJOS*

**MEJORAR EL
APROVECHAMIENTO
DEL AGUA**

DESCOMPACTACION

**Cortinas forestales:
Protección permanente,
Visión de largo plazo**

© 2012 Inav/Geosistemas SRL

© 2012 Cnes/Spot Image

34°39'25.09" S 64°53'33.93" O elev. 258 m

Google earth

2007

Alt. ojo 2.65 km

Rugosidad superficial: “cortando el médano”

Foto cedida por Ing. Agr. J.P. Miñan, Jovita

Cultivos de cobertura: protección temporaria

Cultivos de cobertura

Protección superficial en período crítico

Aporte de MO = f (momento secado)

Depresión de napas (20-40 cm)

Menor contaminación de napas (NO_3)

Pre-arrancado

Arrancado

Post-cosecha

<<<<

Riesgo de implantación

>>>>

>>>>

Problemas a cosecha

<<<<

>>>>

Producción de M.S.

<<<<

Síntesis final

Largo Plazo

**Manejo del
agua**

**Cobertura
superficial**

**Control de
compactación**

Rotación larga

Nivel de MO

**Franjas -
sistematización**

Corto Plazo

**Cultivo de
cobertura**

**Lineas de
siembra**

**Labores de
emergencia**

Cosechar napa